

MASTERSil®

MASTERSil®

MASTERSil®

CZ / OXI TABLET 20g

Charakteristika: MASTERSil® OXI – Tablet, jsou tablety na bázi aktivního kyslíku. Jsou určeny pro průběžné ošetření bazénové vody. Postupně se rozpouští bez zápachu. Lze je používat nezávisle na tvrdosti vody, působí mírně kyselé a tím lehce snižují hodnotu pH vody. Přítomnost kyslíku zaručuje likvidaci běžně se vyskytujících bakterií a řas. **Návod k použití:** Díky nepřítomnosti zápachu jsou vhodné nejen pro úpravu vody v bazénech, ale především také ve vířivkách a SPA. Vzhledem k rychlému úbytku přebytkového kyslíku je možné se koupat velmi brzy po ošetření bazénové vody tímto přípravkem. Používejte společně s MASTERSil® OXI Šok granulát, MASTERSil® Křišťál, MASTERSil® Algicid, MASTERSil® pH+ a pH- pro komplexní úpravu bazénové vody. **Dávkování:** Tabletů vložte do plováku nebo do skimmeru, jedna tableta vydrží orientačně 3-6 dnů (dle teploty a zatížení – čistoty vody). Jedna tableta 20g je vhodná pro ošetření cca 1m³ vody, 200g tableta pro cca 10m³ vody. Hodnotu kyslíku měřte testrem a udržujte ji v rozmezí 5 – 10 mg/l, hodnotu pH v rozmezí 7,0 – 7,4. Při vyšším zatížení bazénu (vyšší teploty, počet koupajících se, znečištění, ...) doporučujeme spojit s dávkováním MASTERSil® Algicid. **Obsahuje:** bis (peroxymonosíran)-bis (síran) pentadraselný 100%, (CAS: 70693-62-8). **Standardní věty o nebezpečnosti:** H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké podráždění a poškození očí. **První pomoc:** Při nadychnutí: Postiženého přenechte na čerstvý vzduch. Při potížích vyhledejte lékařské ošetření. Při styku s kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv. Postižená místa na kůži oplachujte velkým množstvím vody alespoň 15 minut. Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách vodou po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařské ošetření. Při požití: Nevypovlávejte zvracení. Nepodávejte uhlíkatý/hydrogenuhlíkatý (sodu/jedlou sodu). Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc ve zdravotnickém zařízení. **Skladování:** Skladujte v uzavřených, originálních obalech, v suchu a chladu, v dobře větraných místech, odděleně od potravin a krmiv, mimo zdroje tepla, ohně a hořlavých látek. **Údaje pro dekontaminaci:** V případě rozsypaní tablety smetě, zabraňte prašnosti, případně důkladně odsajte a umístěte do vhodné nádoby na odpad. **Upozornění:** Dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s přípravkem. **Záruční doba:** 24 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných skladovacích podmínek. **Datum výroby / expirace:** Uvedeno na obalu výrobku. **Používejte biocidní přípravky bezpečně.** Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Přípravek je určen pro neprofesionální použití.

NEBEZPEČÍ / NEBEZPEČENSTVO:



OXI Tablet 20g



Pro průběžnou úpravu vody v bazénech
ŽÁDNÝ CHLOR – POUZE AKTIVNÍ KYSLÍK

500 g

SK / OXI TABLET 20g

Charakteristika: MASTERSil® OXI – Tablet, sú tablety na báze aktívneho kyslíka. Sú určené pre priebežné ošetrovanie bazénovej vody. Postupne sa rozpúšťa bez zápachu. Možno ich používať nezávisle na tvrdosti vody, pôsobi mierne kyselo a tým ľahko znižujú hodnotu pH vody. Pritomnosť kyslíka zaručuje likvidáciu bežne sa vyskytujúcich baktérií a rias. **Použitie:** Vďaka neprítomnosti zápachu sú vhodné nielen pre úpravu vody v bazénoch, ale predovšetkým tiež vo vírivkách a SPA. Vzhľadom k rýchlemu úbytku prebytkového kyslíka je možné sa kúpať veľmi skoro po ošetrovaní bazénovej vody týmto prípravkom. Používajte spoločne s MASTERSil® OXI Šok granulát, MASTERSil® Krišťál, MASTERSil® Algicid, MASTERSil® pH+ a pH- pre komplexnú úpravu bazénovej vody. **Dávkovanie:** Tabletú vložte do plováku alebo do skimmeru, jedna tableta vydrží orientačne 3 - 6 dní (podľa teploty a zaťaženia - čistoty vody). Jedna tableta 20g je vhodná pre ošetrovanie cca 1m³ vody, 200g tableta pre cca 10m³ vody. Hodnotu kyslíka merajte testerom a udržujte ju v rozmedzí 5 - 10 mg/l, pH hodnoty v rozmedzí 7,0 - 7,4. Pri vyššom zaťažení bazéna (vyššie teploty, počet kúpajúcich sa, znečistenie, ...) odporúčame spojiť s dávkovaním MASTERSil® Algicid. **Obsahuje:** bis (peroxymonosíran)-bis (síran) pentadraselný 100%, (CAS: 70693-62-8). **Výstražné upozornenia:** H302 Škodlivý po požití. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. **Bezpečnostné upozornenie:** P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevypovláajte zvracanie. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite vyhľadajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM/lekára. **Prvá pomoc:** Pri nadychnutí: Postihnutého preneste na čerstvý vzduch. Pri problémoch vyhľadajte lekárske ošetrovanie. Pri styku s pokožkou: Vyzlečte kontaminovaný odev. Postihnuté miesta na koži omývajte veľkým množstvom vody aspoň 15 minút. Pri zasiahnutí očí: Ak má postihnutý kontaktné šošovky, okamžite ich vyberte. Okamžite začnite vyplachovať oči pri otvorených viečkach vodou po dobu najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekárske ošetrovanie. Pri požití: Nevypovláajte zvracanie. Nepodávajte uhlíkatý/hydrogenuhlíkatý (sodu/jedlou sodu). Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc v zdravotníckom zariadení. **Skladovanie:** Skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v suchu a chlade, v dobre vetraných miestach, oddelene od potravín a krmív, mimo zdroja tepla, ohňa a hořlavých látok. **Údaje pre dekontamináciu:** V prípade rozsypania tablety smetajte, zabráňte prašnosti, prípadne dôkladne odsajte a umiestnite do vhodnej nádoby na odpad. **Upozornenie:** Dodávateľ neručí za škody spôsobené nesprávnym nakladaním s prípravkom. **Záručná doba:** 24 mesiacov od dátumu výroby pri uchovaní v pôvodnom obale a dodržaní správnych skladovacích podmienok. **Dátum výroby/expirácie:** Uvedené na obale výrobku. **Používajte biocidne výrobky bezpečne.** Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Prípravek je určený pre neprofesionálne použitie.

Distribuce v ČR: DONAUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
tel.: +420 317 070 220, fax +420 317 070 230
email: donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz

Distribúcia v SR: DONAUCHEM spol. s r.o., Trnavská cesta 82/A, 821 02 Bratislava
tel.: +421 249 206 510, fax +421 249 206 500
email: donauchem@donauchem.sk, www.donauchem.sk

